



# Informatie over dreigende uitdroging



Bij meer dan 3x waterdunne diarree op 1 dag.



Bij langer dan 5 dagen blootstelling aan een omgevingstemperatuur van 27 C of hoger



Bij langer dan 2 dagen koorts hoger dan 38,5 C



Bij meer dan 3x overgeven op 1 dag.

Is 1 of meerdere van bovenstaande situaties van toepassing op u, en u gebruikt 1 van de medicijnen vermeld op de achterkant van deze folder, dan moet u hier tijdelijk mee stoppen. U mag weer starten met de medicijnen wanneer de klachten langer dan 24 uur (= 1 dag) voorbij zijn en u weer normaal eet en drinkt.

Is 1 of meerdere van bovenstaande situaties van toepassing op u en gebruikt u **furosemide** of **bumetanide**, neem dan contact op met uw (huis)arts.

# Overzicht medicijnen

- **Metformine**
- **Hydrochloorthiazide**
- **Chloortalidon**

## ACE-remmers

- Benazepril (Cibacen®)
- Captopril
- Enalapril (Renitec®)
- Enalapril/hydrochloorthiazide
- Enalapril/lercanidipine (Lertec®)
- Fosinopril (fosinorm®)
- Lisinopril
- Lisinopril/hydrochloorthiazide
- Perindopril (Coversyl Arg®)
- Perindopril/amlodipine (Coveram arg®)
- Perindopril/amlodipine/indapamide (Triplixam®)
- Perindopril/bisoprolol (Cosimprel®)
- Ramipril
- Zofenopril (zofil®)

## AT-II antagonisten

- Amlodipine/valsartan (Copalìa®, Exforge®)
- Amlodipine/valsartan/hydrochloorthiazide (Exforge HCT®)
- Candesartan (Atacand®)
- Candesartan/hydrochloorthiazide (Atacand Plus®)
- Eprosartan (Teventen®)
- Eprosartan/hydrochloorthiazide (Teventen Plus®)
- Irbesartan (Aprovel®)
- Irbesartan/Hydrochloorthiazide (Co-Aprovel®, Converide®)
- Losartan (Cozaar®)
- Losartan/hydrochloorthiazide (Fortzaar®, Hyzaar®, Cozaar Plus®)
- Olmesartan (Olmotec®)
- Olmesartan/Hydrochloorthiazide (Olmotec HCTZ®)
- Olmesartan/amlodipine (Sevikar®)

- Olmesartan/amlodipine/hydrochloorthiazide (Sevikar hct®)
- Telmisartan (Micardis®)
- Telmisartan/Hydrochloorthiazide (Micardis Plus®, Actelsar hct®)
- Valsartan (Diovan®)
- Valsartan/Hydrochloorthiazide (Co-diovan®)

## SGLT-2 remmers

- Canagliflozine (Invokana®)
- Dapagliflozine (Forxiga®)
- Dapagliflozine/metformine (Xigduo®)
- Empagliflozine (Jardiance®)
- Empagliflozine/metformine (Synjardy®)
- Ertugliflozine (Steglatro®)
- Ertugliflozine/metformine (Stegluromet®)
- Ertugliflozine/sitagliptine (Steglujan®)

## NSAIDs

- Aceclofenac (Biofenac®)
- Celecoxib (Celebrex®)
- Dexketoprofen (Stadium®)
- Diclofenac (Cataflam®, Voltaren K®)
- Diclofenac/Misoprostol (Arthrotec®)
- Etoricoxib (Arcoxia®)
- Fenylbutazol
- Ibuprofen (Advil®, Nurofen®, Spidifen®)
- Indometacine
- Ketoprofen (Rilief®)
- Meloxicam
- Nabumeton (Mebutan®)
- Naproxen (Aleve®)
- Naproxen/esomprazol (Vimovo®)
- Piroxicam
- Tiaprofeenzuur (Surgam®)